

Instrucciones para los medicamentos de Diabetes

Si usted toma las siguientes pastillas para la diabetes (hipoglicemiantes orales)

Amaryl, Chlorpropamide Diabetea, Diabinese Glipizide, Glucotrol, Glucovance, Glyburide Glynase, Metaglip, Micornase, Tolbutamide, Tolazamide, Prandin, Starlix

El día antes del examen: Tome la dosis usual

El día del examen: No tome la medicina antes del examen, la podrá tomar

Si usted toma las siguientes pastillas para la diabetes: *Avandamet, Avandia, Glucophage, Metformin*

No Changes; continue with usual dose the day before and day of exam.

Si usted esta en Insulina;

Y usa: Humalog, Novolog, Regular insulin

Ajuste su dosis de acuerdo a los resultados de su indicador de la azucar en la sangre (finger-stick) y las calorías que coma.

Y usa: Humalog 5/25, Humulin 70/30, Lente, Novolog 70/30, NPH, Ultra Lente

Noche antes de la preparacion: Disminuya la dosis nocturna a la mitad de la dosis usual.

El día de la preparacion: Disminuya todas las dosis a la mitad de la dosis usual

El día del examen: No use insulina para nada, a menos de que se le instruya lo contrario.

Y usa: Lantus, Levemir

La noche antes de la preparacion: Disminuya la dosis a la mitad de lo usual.

Día de la preparacion: Disminuya la dosis nocturna a la mitad de lo usual.

Las instrucciones descritas arriba son solo guias que pueden ser cambiadas por su medico si lo considera necesario.

